

Exista situatii care impun vizita imediata la medicul neonatolog. De aceea este recomandat sa urmariti permanent starea nou nascutului si sa actionati imediat ce apar semnele de alarma :

- accentuarea icterului (culoarea galbena a pielii bebelusului)
- bebelusul refuza sanul sau biberonul
- bebelusul este somnolent sau, dimpotriva, foarte agitat (ati exclus colicile care sunt dureri abdominale ce provoaca crize de plans, "frecarea" picioruselor si care se linistesc dupa ce copilul a eliminat gaze)
- pielea regiunii fesiere se inroseste foarte mult sau apar mici puncte rosii (eritem eroziv fesier)
- se observa inrosirea regiunii ombilicului insotita sau nu de secretie galben-verzuie urat mirositoare (semn de infectie la acest nivel, omfalita). Pana la intalnirea cu medicul neonatolog sau pediatru, aplicati alcool de 70° si apoi pudrati cu Baneocin
- aparitia unei secretii conjunctivale persistente, de culoare galben-verzuie
- scaunele se modifica si devin de culoare verzui, foarte moi si urat mirositoare

Medicamente de urgenta in casa

- Paracetamol supozitoare 125mg
- Novocalmin supozitoare 300mg
- Glicerina supozitoare pentru copii (se administreaza intrarectal ½ supozitor, in caz de constipatie)

Se administreaza numai la recomandarea medicului !

Alte produse farmaceutice de care aveti nevoie pentru ingrijirea nou nascutului :

Vigantol (vitamina D) se administreaza cate 2 - 3 picaturi direct in gurita, din a 14-a zi de viata, zilnic pana la varsta de 2 ani

- Baneocin pudra si alcool medicinal 70° pentru ingrijirea bontului ombilical
- Comprese sterile pentru toaleta oculara, ingrijirea bontului ombilical
- Ser fiziologic 0,9 % pentru toaleta zilnica oculara si nazala
- Exista mai multe solutii pentru colici. Daca e cazul, se pot administra alternativ doua produse pentru a acoperi toate mesele; se administreaza direct in gurita sau in lapte, inainte de supt.