

# LIMFORETICULOZA BENIGNĂ (FEBRA ZGÂRIETURII DE PISICĂ) : CAUZE, SIMPTOME, DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT

mai 27, 2021 | [Boli Infectioase](#)



Limforeticuloza benignă (Febra zgârieturii de pisică) este o boala bacteriană subcută pe care o persoană o poate dobândi atunci când este mușcată, zgâriată sau linsă de o pisică care este infectată cu bacteria *Bartonella henselae*.

Infecția nu provoacă de obicei complicații severe, dar poate duce la probleme pentru persoanele cu un sistem imunitar slab. Știind cum să depistezi febra zgârieturilor pisicilor, te poți asigura că o persoană primește un tratament rapid.

Pisicile pot transmite mai multe tipuri de infecții la oameni. Unele dintre aceste boli pot fi severe. Efectuarea consultațiilor de rutină pentru o pisică reduce adesea riscul multor boli.

## **CAUZE**

O persoană poate avea febra zgârieturii de pisică după o zgârietură sau mușcătură de la o pisică infectată. Bacteria *Bartonella henselae* (*B. henselae*) trăiește în saliva unei pisici. Poate trece la o persoană printr-o zonă deschisă a pielii. Febra zgârieturilor pisicilor este mai frecventă toamna și iarna, când oamenii sunt înăuntru și se joacă cu pisicile lor. Copiii sunt mai predispuși decât adulții să o aibă.

## **SIMPTOME**

Febra zgârieturilor de pisică nu provoacă de obicei simptome în primele câteva zile sau săptămâni după expunere, când bacteriile se înmulțesc în organism. Aproximativ la 3 până la 14 zile după ce a apărut prima dată infecția, o persoană poate vedea o mică umflătură sau vezicule pe zona de contact, cel mai frecvent pe:

- brațe
- palme
- scalp
- cap

Medicii numesc aceasta o leziune de inoculare. Este posibil ca această leziune să nu apară în unele cazuri sau este posibil ca o persoană să nu o observe pe corp.

Câteva săptămâni mai târziu, ganglionii limfatici din apropierea leziunii se pot inflama. Ganglionii limfatici sunt responsabili pentru filtrarea bacteriilor și a altor particule și pentru crearea celulelor sistemului imunitar. De obicei, se simt ca niște umflături mici, spongioase,

rotunde sau ovale. Dacă o persoană a avut o mușcătură sau o zgârietură pe braț, ganglionii limfatici de sub braț sau lângă cot pot fi deosebit de sensibili.

Uneori, ganglionii limfatici se umflă până la 5 cm. Ei pot fi calzi la atingere, umpluți cu lichid sau roșii. Aceștia pot rămâne umflați 2-3 săptămâni. Pentru majoritatea oamenilor, ganglionii limfatici umflați sunt singurul simptom. Cu toate acestea, alte simptome care ar putea apărea includ:

- durere abdominală
- pierderea poftei de mâncare
- febră
- oboseală
- o durere de cap
- dureri articulare
- o erupție cutanată
- o durere în gât

O persoană ar trebui să se prezinte la un medic dacă are o zgârietură care continuă să crească în dimensiuni după 2 zile.